

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 鼻炎用点鼻薬

### 第2類医薬品

鼻みず・鼻づまりに・・・

# ルル<sup>®</sup>点鼻スプレー

### ルル点鼻スプレーの特徴

- 液ダレせず、鼻腔内粘膜に付着して効果を発揮するジェルタイプの点鼻薬です。
- ジェルを一定量噴霧できる定量容器を使用しています。
- 鼻みず・鼻づまりに効果を発揮するナファゾリン塩酸塩、クロロフェニラミンマレイン酸塩を配合しています。
- 鼻粘膜の炎症をおさえるグリチルリチン酸二カリウムを配合しています。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期連用しないで下さい。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### ■ 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭重



鼻みず・・・



鼻づまり・・・

## ■ 使用法

年 齢	使用法
成人（15歳以上） 及び7歳以上の小児	1回に1～2度ずつ鼻腔内に噴霧 3時間以上の使用間隔をおいて1日6回まで 使用できます。
7歳未満の小児	使用しないで下さい。


### 〈使用法に関連する注意〉

- (1) 定められた使用法を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 7歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (4) 点鼻用にのみ使用して下さい。

### 〈点鼻容器の使用方法〉



1  
キャップをはずして、図のように容器を持って下さい。初回使用時やしばらく間隔をおいてからご使用になるときは、薬液が噴霧するまで空押しして下さい。



2  
ノズルを鼻腔内に入れ、静かに息を吸いながら、1～2度ずつ噴霧して下さい。



3  
ご使用後は、ノズルの先を清潔なティッシュペーパーなどでふき、キャップを閉めて下さい。

(注) 液の出が悪いからといって、噴霧口を針などで突くことはしないで下さい。故障の原因となります。

## ■ 成分・分量

本剤は、1mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	0.5mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、充血を除き、鼻づまりをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	くしゃみ、鼻みずなどのアレルギー症状をやわらげます。
リドカイン	3mg	鼻粘膜の痛み、かゆみをしずめます。
ベンゼトニウム塩化物	0.2mg	細菌による鼻粘膜の炎症をしずめます。
グリチルリチン酸二カルcium	3mg	鼻粘膜のアレルギー反応をおさえ、炎症をやわらげます。

添加物：L-メントール、マクロゴール、カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、エデト酸Na、グリセリン、等張化剤、pH調節剤

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップを閉めて保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 一度開封した後はなるべく早くご使用下さい。(品質保持のため)
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 03 (5205) 8331  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ルルについて詳しくは [www.lulu.jp](http://www.lulu.jp)

08®登録商標

販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元  
東興薬品工業株式会社  
富山県中新川郡立山町辻20